

◎ユーロジン錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】エスタゾラム (U) Estazolam 【分類】睡眠導入剤 [BZ系・中間型]

【単位】 ◎1mg・▼2mg/錠

【常用量】 1~4mg

【用法】 分1睡前

【透析患者への投与方法】 常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (12)

【特徴】 消失半減期が約24時間と中間作用型。臓器毒性が低く、耐性も生じにくく、依存も形成されにくい。反面、眠気、倦怠感、ふらつき等を翌朝まで持ち越すことがある。

【主な副作用・毒性】 依存性、禁断症状、奇異反応(分裂病)、眠気、運動失調、肝・腎障害、CO₂ナルコーシス、汎血球減少、味覚異常など

【F】 98% [マウス] (1)

【tmax】 4.9±2.3hr (1) 0.5~6hr (U)

【代謝】 酸化及び水酸化され非活性代謝物・またはほとんど活性のない代謝物になる (1,U)

【排泄】 尿中未変化体排泄率3.6% [72hrまで] (1)

【CL】 0.24±0.04mL/min/kg [po] (1)

【t1/2】 10~24hr (U) 8~24hr (12)

【蛋白結合率】 80.2% [ラット] (1) 93% (U,12)

【Vd】 データなし (12) Vd/F=0.57±0.16L/kg (1)

【MW】 294.74

【透析性】 透析性は低いと思われる (5)

【O/W係数】 ∞ [クロロホルム系] (1) [pKa] 2.84 (1)

【備考】 長期投与に際しては定期的に肝機能、腎機能、血液等の検査を行うことが望ましい (1)

【更新日】 20250524

※正確な情報を掲載するよう努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の損害について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインターネットフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断複数・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。