
△ワッサーV 配合顆粒 [内] 【販売中止】

【重要度】★ 【一般製剤名】VB1、B2、B6、ニコチン酸アミド、パントテン酸 Ca、VC 【分類】水溶性ビタミン複合剤

【単位】△1g/包

【常用量】1g/日

【用法】分1

【透析患者への投与方法】添付文書上に腎不全患者は慎重投与、投与禁忌になっていないが、透析患者にはVC 欠乏時に最小用量に制限すべきである (Proc EDTA-ERA 22:147-51,1985) 他の成分については減量する必要はない (5) 【その他の報告】VC の代謝物のシュウ酸が蓄積しシュウ酸 Ca が組織に沈着するためVC として100mg/日以下が望ましい (Nephron 39:112-6,1985)

【保存期 CKD 患者への投与方法】VC の代謝物のシュウ酸が蓄積するためVC 欠乏時に必要最小限を投与する (5)

【特徴】水溶性ビタミンの複合剤。1g 中チアミン硝酸化物 3mg、リボフラビン 3mg、ピリドキシン塩酸塩 5mg、ニコチン酸アミド 30mg、パントテン酸カルシウム 30mg、アスコルビン酸 200mg を含有。湿疹・皮膚炎群、口唇炎・口角炎・口内炎のうち、ビタミン欠乏が原因と考えられるものについて適用。

【主な副作用・毒性】悪心・嘔吐、下痢、腹痛、顔面紅潮 (ニコチン酸アミド)

【TDM のポイント】TDM の対象にはならない

【更新日】20170216

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。