

## △エンペシドクリーム [外]

【重要度】 【一般製剤名】 クロトリマゾール Clotrimazole 【分類】 抗真菌剤

【単位】 △1本 10g [1%] ※トローチ, 錠剤, 外用液は2024年3月で経過措置満了

【常用量・用法】 ■錠剤: 1回1個, 6日間継続するが, 必要に応じ延長 ■クリーム: 1日2~3回塗布

【特徴】 イミダゾール系抗真菌薬。トリコモナスや一部のグラム陽性菌に対しても抗菌力がある。発泡性錠剤のため崩壊性がよく, 腔内病原真菌に効果的に作用し短期間(通常6日間)で優れた臨床効果を示す。白癬症・カンジダ症に対して強力な抗真菌作用を示し, 特に皮膚糸状菌に対しては殺菌的に作用する。皮膚浸透性に優れ, 皮膚刺激性が少ない。

【主な副作用・毒性】 錠剤: 局所の灼熱感, 陰唇の浮腫, 肛門周囲炎。クリーム: 局所の刺激感, 皮膚炎, 発赤・紅斑, びらん, 丘疹

【吸収】 錠剤, 外用剤ともに血中には検出されない (1)

【代謝】 資料なし (1)

【排泄】 資料なし (1)

【蛋白結合率】 50% (11)

【Vd】 1L/kg (11)

【MW】 344.84

【透析性】 資料なし (1)

【TDMのポイント】 TDMの対象にならない。10  $\mu\text{g/mL}$  までの濃度では静真菌的に, それ以上では殺真菌的に作用する (1) 【O/W係数】 高い (11) 資料なし (1)

【更新日】 20230627

※正確な情報を掲載するように努力していますが, その正確性, 完全性, 適切性についていかなる責任も負わず, いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし, それらを利用した結果, 直接または間接的に生じた一切の問題について, 当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は, 日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。