

○ドレニゾンテープ [外] <製造中止>

【重要度】 【一般製剤名】フルドロキシコルチド fludrocortide 【分類】ステロイド外用貼付剤

【単位】○7.5cm×10cm (4 μ g/cm²)

【用法】患部を軽く洗浄しよく乾燥させた後、適当な大きさに切り取り患部に貼付。12時間または24時間ごとに貼りかえ

【透析患者への投与方法】減量の必要はないと思われる (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【特徴】病変部を密封することにより汗の蒸発、表皮内リンパ迷路より水分の蒸発が防止され、そのために角質が軟化しバリアゾーンが破壊され、また毛のう内物質が軟化し、ステロイドの浸透が促進されて所期の効果を発揮するのを目的として、ステロイドを粘着テープに均等に含ませた外用テープ

【主な副作用・毒性】眼圧亢進、緑内障、後のう白内障、局所炎症、毛のう炎、皮膚萎縮など

【吸収】皮膚 (1)

【MW】436.53

【効果発現時間】4~5時間 (1)

【効果持続時間】12~24時間 (1)

【禁忌】細菌・真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症、および動物性皮膚疾患、鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎、潰瘍（バーチエット病は除く）、第2度深在性以上の熱傷・凍傷

【更新日】20231017

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。