

---

△半夏瀉心湯エキス顆粒（14）[ツムラ] [内]

---

【重要度】 【分類】漢方製剤

【単位】△2.5g/包

【常用量】7.5g/日

【用法】分2または分3(食前 又は 食間)

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】心下痞硬、恶心・嘔吐、食欲不振を目標として用い、腹中雷鳴して下痢するものにも用いる。舌には白苔のあることもあり、ないこともある。アフタ性口内炎やベーチェット病などにも用いられる。六君子湯で軽快しない上部消化管症状に適用。実証寄り、オウゴン、オウレンで冷ます。

【主な副作用・毒性】間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパシー、発疹、尋麻疹など

【更新日】20220526

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適合性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わぬものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインターネットフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断複数・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。