

◎六君子湯エキス顆粒 (43) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ◎2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分2～3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 四君子湯と二陳湯の合方で、胃腸が弱く四君子湯の証に加えて胃内に停水のあるものに用いる。比較的体力の低下した人で、心下部がつかえ、食欲不振、疲れやすく、貧血気味で脈も腹も軟弱で常に手足が冷えやすい虚証のものに用いる。

【主な副作用・毒性】 偽アルドステロン症、肝障害、発疹、蕁麻疹、悪心、腹部膨満感、下痢など

【更新日】 20121103

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。