

## ○ジクロード点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】ジクロフェナクナトリウム diclofenac sodium 【分類】非ステロイド性抗炎症点眼剤

【単位】○5mL/本 [0.1%]

【用法】眼手術前4回(3hr前, 2hr前, 1hr前, 30min前) ■眼手術後1日3回, 1回1滴

【透析患者への投与方法】常用量(1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量(1)

【特徴】白内障手術時における術後炎症症状、術中・術後合併症の防止に用いられる。ジクロフェナクナトリウムの水溶性抗炎症点眼剤。白内障手術後の炎症に際し、ステロイドと同等もしくはそれ以上の抗炎症効果を発揮し、術後のフィブリン析出、CMEの発現を防止。

【主な副作用・毒性】びまん性表層角膜炎、角膜びらん、一過性の疼痛、搔痒感、乾燥感

【吸収率】

【MW】318.13

【pKa】4.0 (1)

【更新日】20140825

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。