

△ゼフナートクリーム・△外用液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 リラナフタート liranafate 【分類】 抗真菌剤

【単位】 △クリーム 10g/本 [2%]・△外用液 10mL/本 [2%]

【用法】 1日1回患部に塗布

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 チオカルバミン酸系で1日1回塗布の抗真菌薬。真菌細胞のスクワレン・エポキシ化反応を阻害し、細胞膜構成成分であるエルゴステロール生合成阻害により抗真菌作用（殺真菌的）を示す。白癬に対し効果を示し皮膚貯留性が良好とされる。

【主な副作用・毒性】 接触性皮膚炎、掻痒、発赤、紅斑

【吸収】 皮膚 (1)

【代謝】 肝臓 (1)

【蛋白結合率】 90.9～100% (1)

【MW】 328.43

【O/W 係数】 5.19 以上 [1-オクタノール/水系] (1)

【更新日】 20170613

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。