透析患者に関する薬剤情報

医療法人仁真会 白鷺病院 薬剤科

## ○エコリシン眼軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩+コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム erythromycin lactobionate(EM)+colistin sodium methanesulfonate(CL) 【分類】エリスロマイシン・コリスチン複合眼軟膏剤

【単位】軟膏:○3.5g/本 【用法】1日数回点眼塗布

【透析患者への投与方法】常用量(1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量(1)

【特徴】エリスロマイシンとコリスチンの合剤で1g中、エリスロマイシンラクトビオン酸塩5mg、コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム5mg(15万単位)含有. 感受性菌に対してエリスロマイシンの細菌蛋白合成阻害作用とコリスチンの細胞質膜を障害する作用が相まって抗菌作用を呈する.

【主な副作用・毒性】眼瞼炎、眼瞼皮膚炎、そう痒感、結膜充血

【備考】点眼液は販売中止(201703)

【更新日】20170119

※正確は情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適別性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、 直接または間間遊びに生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。 ※本サイトに掲載の記事・写真などの無期転載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法拡びに国際条約により保護されています。